

大腸癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月（155 日）以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
0 期	－	27	(1-3)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(1-3)
I 期	25	(7-9)	(4-6)	－	－	－	－	－	(4-6)	－	(1-3)	－	－
II 期	12	－	(1-3)	－	－	(1-3)	－	－	(4-6)	－	(1-3)	－	－
III 期	15	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	－	(1-3)	10	－	(1-3)	－	－
IV 期	(4-6)	－	－	－	(7-9)	(1-3)	－	－	(7-9)	－	－	－	(1-3)

