

食道癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155 日)以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法 のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
0 期	－	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
I 期	(7-9)	15	－	－	－	(1-3)	－	－	(1-3)	－	(1-3)	－	(4-6)
II 期	(7-9)	－	－	－	(4-6)	－	－	－	(4-6)	－	－	－	(1-3)
III 期	(1-3)	－	－	－	－	(1-3)	－	－	(7-9)	－	－	－	(1-3)
IV 期	(1-3)	－	－	－	(4-6)	(4-6)	－	－	(1-3)	－	－	－	(1-3)

