

食道がん 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月（155 日）以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 ＋内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 ＋薬物	薬物 ＋その他	手術／内視鏡 ＋放射線	手術／内視鏡 ＋薬物	手術／内視鏡 ＋その他	手術／内視鏡 ＋放射線＋薬物	その他	治療なし
0 期	－	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(4-6)
I 期	(7-9)	17	(1-3)	(1-3)	－	－	－	－	(1-3)	－	(1-3)	－	－
Ⅱ期	(1-3)	－	－	－	－	(1-3)	－	－	(4-6)	－	－	－	－
Ⅲ期	(1-3)	－	－	－	(1-3)	(1-3)	－	－	(4-6)	－	－	－	(1-3)
Ⅳ期	－	－	－	－	(4-6)	(4-6)	－	－	(1-3)	－	－	－	－

