


部位別登録数

がんの原発部位（最初にがん（腫瘍）が発生した部位）を集計したものです。

部位	登録者数		
	2021	2022	2023
口腔	49	38	35
唾液腺	(4-6)	(7-9)	(1-3)
上咽頭	(4-6)	-	(1-3)
中咽頭	21	21	15
下咽頭	36	36	33
食道	135	119	105
胃	216	212	168
小腸	91	71	76
結腸	159	147	155
直腸	77	89	78
(大腸)※	236	236	233
肛門／肛門管	(1-3)	(1-3)	(1-3)
肝臓	67	73	68
胆嚢・胆管	31	36	45
膵臓	81	114	96
喉頭	17	16	21
肺	212	218	262
骨軟部	31	35	35
皮膚	156	152	189

部位	登録者数		
	2021	2022	2023
乳房	246	289	277
膣・外陰	(7-9)	(7-9)	12
子宮頸部	89	65	85
子宮体部	32	44	52
子宮(部位不明)	-	(1-3)	-
卵巣	20	36	30
前立腺	338	344	291
精巣	12	(1-3)	14
腎	103	81	99
膀胱	70	68	79
腎盂・尿管	11	17	23
脳神経	78	107	93
甲状腺	59	47	43
悪性リンパ腫	137	149	162
多発性骨髄腫	19	22	27
白血病	35	30	37
他の血液	29	24	32
その他	72	79	107
総数	2,748	2,799	2,850


※大腸は結腸と直腸を合計した数です。




男女別・部位別登録数

部位	男性			女性		
	登録数			登録数		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
口腔	28	25	24	21	13	11
唾液腺	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(4-6)	(1-3)
上咽頭	(4-6)	-	(1-3)	(1-3)	-	-
中咽頭	19	16	12	(1-3)	(4-6)	(1-3)
下咽頭	33	32	30	(1-3)	(4-6)	(1-3)
食道	111	91	78	24	28	27
胃	146	143	113	70	69	55
小腸	56	44	44	35	27	32
結腸	94	79	90	65	68	65
直腸	41	52	55	36	37	23
(大腸)※	135	131	145	101	105	88
肛門／肛門管	(1-3)	(1-3)	(1-3)	-	-	(1-3)
肝臓	49	58	49	18	15	19
胆嚢・胆管	18	21	31	13	15	14
膵臓	53	71	59	28	43	37
喉頭	17	14	17	-	(1-3)	(4-6)
肺	132	127	155	80	91	107
骨軟部	17	19	17	14	16	18
皮膚	77	77	101	79	75	88
乳房	(1-3)	(1-3)	(1-3)	245	288	276
陰・外陰	-	-	-	(7-9)	(7-9)	12
子宮頸部	-	-	-	89	65	85
子宮体部	-	-	-	32	44	52
子宮(部位不明)	-	-	-	-	(1-3)	-
卵巣	-	-	-	20	36	30
前立腺	338	344	291	-	-	-
精巣	12	(1-3)	14	-	-	-
腎	84	63	70	19	18	29
膀胱	56	47	65	14	21	14
腎盂・尿管	(4-6)	11	15	(4-6)	(4-6)	(7-9)
脳神経	44	48	47	34	59	46
甲状腺	24	10	12	35	37	31
悪性リンパ腫	67	87	74	70	62	88
多発性骨髄腫	10	12	15	(7-9)	10	12
白血病	22	20	23	13	10	14
他の血液	18	13	18	11	11	14
その他	45	47	67	27	32	40
合計	1,626	1,578	1,590	1,122	1,221	1,260


男女の割合
2021



男女の割合
2022




男女の割合
2023




※大腸は結腸と直腸を合計した数です。

男性




女性



症例区分

がんの診断および初回治療を、どの施設で実施・開始したかを判断する項目です。

	登録数
診断のみ	134
自施設診断・自施設初回治療開始	1390
自施設診断・自施設初回治療継続	(4-6)
他施設診断・自施設初回治療開始	919
他施設診断・自施設初回治療継続	188
初回治療終了後	215
総数	2,850



- 【診断のみ】

【自施設診断・自施設初回治療開始】

【自施設診断・自施設初回治療継続】

【他施設診断・自施設初回治療開始】

【他施設診断・自施設初回治療継続】

【初回治療終了後】
- 当院で診断後、他施設へ紹介した症例

当院で診断及び初回治療に関する決定がなされ、治療が開始された症例

当院で診断後、他施設で初回治療が開始され、その後、当院で初回治療を継続した症例

他施設で診断された後、当院で初回治療を開始した症例


他施設で診断された後、他施設で初回治療が開始され、その後、当院で初回治療を継続した症例

他施設で初回治療終了後に当院を受診した症例

胃がん 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月（155 日）以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。


	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
I 期	18	95	(4-6)	-	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	(7-9)
II 期	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III 期	-	-	-	-	-	-	-	-	(4-6)	-	-	-	-
IV 期	-	-	-	(1-3)	10	-	-	-	(1-3)	-	-	(1-3)	(1-3)



大腸がん 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月（155 日）以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。


	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
0 期	－	31	(1-3)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
I 期	20	(7-9)	(4-6)	－	(1-3)	－	－	－	(4-6)	－	－	－	－
II 期	15	－	－	－	－	－	－	－	(7-9)	－	(1-3)	－	－
III 期	21	－	－	－	－	(1-3)	－	－	13	－	－	－	(1-3)
IV 期	(4-6)	－	－	(1-3)	(4-6)	(1-3)	－	－	10	－	(1-3)	－	(1-3)



肝細胞がん 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月（155 日）以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。


	手術のみ	内視鏡のみ	手術 + 内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 + 薬物	薬物 + その他	手術／内視鏡 + 放射線	手術／内視鏡 + 薬物	手術／内視鏡 + その他	手術／内視鏡 + 放射線 + 薬物	その他	治療なし
I 期	10	－	－	(1-3)	－	－	(4-6)	－	－	－	－	(1-3)	(1-3)
II 期	(4-6)	－	－	(4-6)	(1-3)	－	(1-3)	－	－	－	－	(1-3)	－
III 期	(1-3)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(1-3)
IV 期	－	－	－	－	(1-3)	－	－	－	－	－	－	－	－



肝内胆管がん 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月（155 日）以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。


	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
I 期	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II 期	(1-3)	-	-	(1-3)	(1-3)	-	-	-	(1-3)	-	-	-	(1-3)
III 期	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	-
IV 期	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	(1-3)	-	-	-	(1-3)



肺がん(小細胞肺がん) 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155 日)以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。


	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
0 期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I 期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II 期	-	-	-	-	-	(1-3)	-	-	(1-3)	-	-	-	-
III 期	-	-	-	-	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-	-	(1-3)
IV 期	-	-	-	-	(4-6)	-	-	-	-	-	-	-	-



肺がん(非小細胞肺がん) 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155 日)以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。


	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
0 期	13	-	-	-	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	(1-3)
I 期	68	-	-	(7-9)	-	-	-	-	13	-	(1-3)	-	(7-9)
II 期	16	-	-	(1-3)	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	-
III期	(1-3)	-	-	-	(4-6)	(7-9)	-	-	(4-6)	-	(1-3)	-	(1-3)
IV期	(1-3)	-	-	(1-3)	32	10	-	-	(1-3)	-	-	-	(4-6)



乳がん 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月（155 日）以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。


	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
0 期	13	－	－	－	－	－	－	(1-3)	15	－	(7-9)	－	－
I 期	11	－	－	－	(7-9)	－	－	(1-3)	44	－	20	－	－
Ⅱ期	(4-6)	－	－	－	13	－	－	－	29	－	(4-6)	－	－
Ⅲ期	－	－	－	－	(7-9)	－	－	－	(7-9)	－	－	－	－
Ⅳ期	－	－	－	－	(7-9)	－	－	－	－	－	－	－	－



食道がん 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月（155 日）以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。


	手術のみ	内視鏡のみ	手術 ＋内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 ＋薬物	薬物 ＋その他	手術／内視鏡 ＋放射線	手術／内視鏡 ＋薬物	手術／内視鏡 ＋その他	手術／内視鏡 ＋放射線＋薬物	その他	治療なし
0 期	－	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(4-6)
I 期	(7-9)	17	(1-3)	(1-3)	－	－	－	－	(1-3)	－	(1-3)	－	－
II 期	(1-3)	－	－	－	－	(1-3)	－	－	(4-6)	－	－	－	－
III 期	(1-3)	－	－	－	(1-3)	(1-3)	－	－	(4-6)	－	－	－	(1-3)
IV 期	－	－	－	－	(4-6)	(4-6)	－	－	(1-3)	－	－	－	－



膵臓がん 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月（155 日）以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。


	手術のみ	内視鏡のみ	手術 ＋内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 ＋薬物	薬物 ＋その他	手術／内視鏡 ＋放射線	手術／内視鏡 ＋薬物	手術／内視鏡 ＋その他	手術／内視鏡 ＋放射線＋薬物	その他	治療なし
0 期	(7-9)	-	-	-	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	(1-3)
I 期	(1-3)	-	-	-	(4-6)	(1-3)	-	-	(7-9)	-	-	-	(1-3)
II 期	(1-3)	-	-	-	(1-3)	-	(1-3)	-	(1-3)	-	-	-	(1-3)
III 期	-	-	-	(1-3)	(4-6)	-	-	-	(1-3)	-	-	(1-3)	(1-3)
IV 期	-	-	-	(1-3)	20	-	(1-3)	-	-	-	-	-	(4-6)



前立腺がん 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月（155 日）以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。


	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
I 期	26	－	－	－	46	－	－	－	－	－	－	－	13
II 期	(7-9)	－	－	－	14	－	－	(1-3)	－	－	－	－	(1-3)
III 期	(4-6)	－	－	－	26	－	－	－	(4-6)	－	－	－	(1-3)
IV 期	－	－	－	－	19	－	－	－	－	－	－	－	－



子宮頸がん 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月（155 日）以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。


	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
0 期	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(7-9)
I 期	(1-3)	－	－	－	－	－	－	－	(1-3)	－	(1-3)	－	(1-3)
II 期	(1-3)	－	－	(1-3)	－	(4-6)	－	－	(1-3)	－	(1-3)	－	－
III 期	－	－	－	(1-3)	－	11	－	－	－	－	－	(1-3)	－
IV 期	－	－	－	(1-3)	(1-3)	－	－	－	－	－	－	－	－



子宮体がん 治療前ステージ別 治療方法組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月（155 日）以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。


	手術のみ	内視鏡のみ	手術 + 内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 + 薬物	薬物 + その他	手術／内視鏡 + 放射線	手術／内視鏡 + 薬物	手術／内視鏡 + その他	手術／内視鏡 + 放射線 + 薬物	その他	治療なし
I 期	30	－	－	(1-3)	(1-3)	－	－	(1-3)	(4-6)	－	－	－	－
II 期	－	－	－	－	－	－	－	－	(1-3)	－	－	－	－
III 期	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
IV 期	－	－	－	－	(1-3)	－	－	－	－	－	－	－	(1-3)



膀胱がん 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月（155 日）以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。


	手術のみ	内視鏡のみ	手術 ＋内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 ＋薬物	薬物 ＋その他	手術／内視鏡 ＋放射線	手術／内視鏡 ＋薬物	手術／内視鏡 ＋その他	手術／内視鏡 ＋放射線＋薬物	その他	治療なし
0 期	－	(1-3)	－	－	－	－	－	－	24	(1-3)	－	(4-6)	－
I 期	－	(1-3)	(1-3)	－	－	－	－	－	(4-6)	－	－	(7-9)	－
II 期	－	－	－	－	－	－	－	－	(1-3)	－	(1-3)	－	(1-3)
III 期	－	－	－	－	－	－	－	－	(1-3)	－	－	－	－
IV 期	－	－	－	－	－	－	－	－	(1-3)	－	－	－	－



甲状腺がん 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月（155 日）以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。


	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
I 期	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(1-3)
II 期	(7-9)	－	－	－	－	－	－	(1-3)	－	－	－	－	(1-3)
III 期	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
IV 期	(1-3)	－	－	－	－	－	－	(1-3)	(1-3)	－	－	－	－



胆のうがん 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月（155 日）以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。


	手術のみ	内視鏡のみ	手術 ＋内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 ＋薬物	薬物 ＋その他	手術／内視鏡 ＋放射線	手術／内視鏡 ＋薬物	手術／内視鏡 ＋その他	手術／内視鏡 ＋放射線＋薬物	その他	治療なし
0期	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
I 期	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ⅱ 期	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ⅲ 期	(1-3)	－	－	－	－	－	－	－	(1-3)	－	－	－	－
Ⅳ 期	－	－	－	－	(1-3)	－	－	－	－	－	－	－	(1-3)



喉頭がん 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月（155 日）以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。


	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
0 期	-	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I 期	-	(4-6)	-	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II 期	-	(1-3)	-	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	-	-	-	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-
IV期	-	-	-	-	-	(1-3)	-	-	(1-3)	-	-	-	-



腎がん 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月（155 日）以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。


	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
I 期	31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	34	(7-9)
II 期	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
III 期	(1-3)	－	－	－	－	－	－	－	(1-3)	－	－	－	－
IV 期	(1-3)	－	－	－	(1-3)	(1-3)	－	－	(1-3)	－	－	－	(1-3)



腎盂尿管がん 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月（155 日）以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
0 期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1-3)
I 期	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II 期	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	-
III 期	(1-3)	-	-	-	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	-
IV 期	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	(1-3)	-	-	-	-



卵巣がん 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月（155 日）以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
I 期	(7-9)	-	-	-	-	-	-	-	(4-6)	-	-	-	-
II 期	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	-
III 期	(1-3)	-	-	-	(1-3)	-	-	-	(4-6)	-	-	-	-
IV 期	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	(1-3)	-	-	-	-

