

皮膚がん(更新：2020年10月)

レジメン名称	癌種	催吐リスク	レジメン情報	備考
ニホ®療法(悪性黒色腫)(2週毎)	悪性黒色腫	最小度	悪性黒色腫	術後補助化学療法:12ヶ月間まで ニホ®:240mg/body 2週毎
化°リムマ°療法(3週毎)	悪性黒色腫	最小度	根治切除不能な悪性黒色腫	化°リムマ°:3mg/kg 3週毎 4回投与
ハ°ム°療法(悪性黒色腫)(3週毎)	悪性黒色腫	最小度	悪性黒色腫	術後補助化学療法:12ヶ月間まで ハ°ム°:200mg/body
ア°療法(2週毎)	メカ細胞癌	最小度	メカ細胞癌	ア°:10mg/kg 2週間毎
ニホ®+化°リムマ°併用療法(悪性黒色腫)(3週毎)	悪性黒色腫	最小度	根治切除不能で未治療の悪性黒色腫	ニホ®:80mg/body 化°リムマ°:3mg/kg 3週毎
ト°療法(3週毎)	軟部肉腫	軽度	皮膚血管肉腫、乳房外paget病	ト°:60mg/m ² triweekly
weekly ト°療法	軟部肉腫	軽度	皮膚血管肉腫、乳房外paget病	ト°:30mg/m ² weekly
Weekly ハ°療法(2回目以降)(6投2休)	軟部肉腫	軽度	血管肉腫	ハ°:100mg/m ² 6週投与 2週休薬
ハ°療法(3週間毎)	悪性黒色腫	最小度	悪性黒色腫	ハ°:200mg/body 3週毎
ハ°療法(6週間毎)	悪性黒色腫	最小度	悪性黒色腫	ハ°:400mg/body 6週毎