

女性生殖器がん(更新：2025年1月)

レジメン名称	癌種	催吐リスク	レジメン情報	備考
Weekly TC 療法(℞クリタセ℞+加℞ﾌﾟﾗﾁﾝ)	子宮頸癌	中等度	子宮肉腫・子宮頸癌	℞クリタセ℞:60mg/㎡ 加℞ﾌﾟﾗﾁﾝ:AUC2 Day1,8,15/3w
℞℞ｼｽﾁﾏﾌﾟ 単独維持療法(3週毎)	卵巣癌	最小度	再発卵巣癌	維持療法 ℞℞ｼｽﾁﾏﾌﾟ注:15mg/kg 3週毎
DC(ﾄﾍﾞﾀセ℞+加℞ﾌﾟﾗﾁﾝ) 療法	卵巣癌	高度	卵巣癌・卵管癌・腹膜癌	ﾄﾍﾞﾀセ℞:70mg/㎡ 加℞ﾌﾟﾗﾁﾝ:AUC6 1ｸｰﾙ:3-4週
TC 療法(℞クリタセ℞ + 加℞ﾌﾟﾗﾁﾝ)(3週毎)	卵巣癌	高度	卵巣癌・子宮内膜癌	℞クリタセ℞:180mg/㎡ 加℞ﾌﾟﾗﾁﾝ:AUC6
TN 療法(℞クリタセ℞ + ｹﾞﾑｼﾀﾞﾍﾞﾝ) (3-4週毎)	卵巣癌	中等度	卵巣癌・卵管癌	℞クリタセ℞:175mg/㎡ ｹﾞﾑｼﾀﾞﾍﾞﾝ:80mg/㎡
conTC 療法(℞クリタセ℞ + 加℞ﾌﾟﾗﾁﾝ)+Bev(3週毎)	卵巣癌	高度	卵巣癌・子宮内膜癌	℞クリタセ℞:180mg/㎡ 加℞ﾌﾟﾗﾁﾝ:AUC6 ℞℞ｼｽﾁﾏﾌﾟ:15mg/kg
dose-dense TC 療法(℞クリタセ℞ + 加℞ﾌﾟﾗﾁﾝ)(Day8,15/3w)	卵巣癌	軽度	卵巣癌	℞クリタセ℞:80mg/㎡ Day1,8,15
dose-dense TC 療法(℞クリタセ℞ + 加℞ﾌﾟﾗﾁﾝ)(Day1/3w)	卵巣癌	高度	卵巣癌	加℞ﾌﾟﾗﾁﾝ:AUC6 Day1 ℞クリタセ℞:80mg/㎡ Day1,8,15
GC 療法(加℞ﾌﾟﾗﾁﾝ + ｹﾞﾑｼﾀﾞﾍﾞﾝ)(Day1/3w)	卵巣癌	高度	再発卵巣癌	加℞ﾌﾟﾗﾁﾝ: AUC4 Day1 ｹﾞﾑｼﾀﾞﾍﾞﾝ: 1000mg/㎡ Day1,8 1ｸｰﾙ:21日
GC 療法(加℞ﾌﾟﾗﾁﾝ + ｹﾞﾑｼﾀﾞﾍﾞﾝ)(Day8/3w)	卵巣癌	軽度	再発卵巣癌	ｹﾞﾑｼﾀﾞﾍﾞﾝ: 1000mg/㎡ Day1,8
ｹﾞﾑｼﾀﾞﾍﾞﾝ + ｹﾞﾑｼﾀﾞﾍﾞﾝ療法(Day8/3w)	卵巣癌	軽度	再発卵巣癌	ｹﾞﾑｼﾀﾞﾍﾞﾝ:80mg/㎡ Day1 ｹﾞﾑｼﾀﾞﾍﾞﾝ:1000mg/㎡ Day1,8
ｹﾞﾑｼﾀﾞﾍﾞﾝ + ｹﾞﾑｼﾀﾞﾍﾞﾝ療法(Day1/3w)	卵巣癌	中等度	再発卵巣癌	ｹﾞﾑｼﾀﾞﾍﾞﾝ:80mg/㎡ Day1 ｹﾞﾑｼﾀﾞﾍﾞﾝ:1000mg/㎡ Day1,8
ﾄﾞｷﾚﾙｼﾝ塩酸塩℞ｼｰﾑ注 + 加℞ﾌﾟﾗﾁﾝ 療法(90mg/body 未満)(4週毎)	卵巣癌	高度	再発卵巣癌	ﾄﾞｷﾚﾙｼﾝ塩酸塩℞ｼｰﾑ:30mg/㎡ 加℞ﾌﾟﾗﾁﾝ:AUC5
ﾄﾞｷﾚﾙｼﾝ塩酸塩℞ｼｰﾑ注 + ℞℞ｼｽﾁﾏﾌﾟ 療法(90mg/body 未満)(4週毎)	卵巣癌	軽度	再発卵巣癌	ﾄﾞｷﾚﾙｼﾝ塩酸塩℞ｼｰﾑ:40mg/㎡ ℞℞ｼｽﾁﾏﾌﾟ:15mg/kg
ﾄﾞｷﾚﾙｼﾝ塩酸塩℞ｼｰﾑ注 療法(90mg未満)(4週毎)	卵巣癌	軽度	再発卵巣癌	ﾄﾞｷﾚﾙｼﾝ塩酸塩℞ｼｰﾑ:40mg/㎡
ﾄﾞｷﾚﾙｼﾝ塩酸塩℞ｼｰﾑ注 療法(90mg以上)(4週毎)	卵巣癌	軽度	再発卵巣癌	ﾄﾞｷﾚﾙｼﾝ塩酸塩℞ｼｰﾑ:40mg/㎡
5-Day ｻﾄﾒ4ｻｰﾄ療法(筋注)	侵入奇胎	最小度	侵入奇胎	ｻﾄﾒ4ｻｰﾄ:0.4mg/kg 5日間 2週毎
ﾄﾞｷﾚﾙｼﾝ塩酸塩℞ｼｰﾑ注 + 加℞ﾌﾟﾗﾁﾝ + ℞℞ｼｽﾁﾏﾌﾟ 療法(90mg/body 未満)(4週毎) Day1	卵巣癌	高度	再発卵巣癌	ﾄﾞｷﾚﾙｼﾝ塩酸塩℞ｼｰﾑ:30mg/㎡ 加℞ﾌﾟﾗﾁﾝ:AUC5 ℞℞ｼｽﾁﾏﾌﾟ:10mg/kg Day1 4週毎
ﾄﾞｷﾚﾙｼﾝ塩酸塩℞ｼｰﾑ注 + ℞℞ｼｽﾁﾏﾌﾟ 療法(90mg/body 未満)(4週毎)	卵巣癌	軽度	再発卵巣癌	ﾄﾞｷﾚﾙｼﾝ塩酸塩℞ｼｰﾑ:40mg/㎡ ℞℞ｼｽﾁﾏﾌﾟ:15mg/kg
ﾄﾞｷﾚﾙｼﾝ塩酸塩℞ｼｰﾑ注 療法(90mg未満)(4週毎)	卵巣癌	軽度	再発卵巣癌	ﾄﾞｷﾚﾙｼﾝ塩酸塩℞ｼｰﾑ:40mg/㎡
ﾄﾞｷﾚﾙｼﾝ塩酸塩℞ｼｰﾑ注 療法(90mg以上)(4週毎)	卵巣癌	軽度	再発卵巣癌	ﾄﾞｷﾚﾙｼﾝ塩酸塩℞ｼｰﾑ:40mg/㎡
ﾄﾞｷﾚﾙｼﾝ塩酸塩℞ｼｰﾑ注 + 加℞ﾌﾟﾗﾁﾝ + ℞℞ｼｽﾁﾏﾌﾟ 療法(90mg/body 未満)(4週毎) Day1	卵巣癌	高度	再発卵巣癌	ﾄﾞｷﾚﾙｼﾝ塩酸塩℞ｼｰﾑ:30mg/㎡ 加℞ﾌﾟﾗﾁﾝ:AUC5 ℞℞ｼｽﾁﾏﾌﾟ:10mg/kg Day1 4週毎
ﾄﾞｷﾚﾙｼﾝ塩酸塩℞ｼｰﾑ注 + 加℞ﾌﾟﾗﾁﾝ + ℞℞ｼｽﾁﾏﾌﾟ 療法(90mg/body 未満)(4週毎) Day15	卵巣癌	最小度	再発卵巣癌	℞℞ｼｽﾁﾏﾌﾟ:10mg/kg Day15 4週毎
BEP 療法（3週毎）	卵巣癌	高度	卵巣癌	ﾌﾞﾚｲﾏｲｼﾝ:30mg/body Day1,8,15 ｲﾙﾍﾞｼﾞﾝ:100mg/㎡ Day1-5 ｼｽﾌﾟﾗｲﾝ:20mg/㎡ Day1-5 3週毎
CPT-P 療法(卵巣癌)(Day8,15/4w)	卵巣癌	中等度	卵巣癌	ｲﾅﾃｶ:60mg/㎡ Day8,15 4週毎
ﾄﾞｷﾚﾙｼﾝ単剤療法(Day1/3w)	子宮平滑筋肉腫	高度	子宮平滑筋肉腫	ﾄﾞｷﾚﾙｼﾝ塩酸塩:60mg/㎡ Day1 3週毎

女性生殖器がん(更新：2025年1月)

レジメン名称	癌種	催吐リスク	レジメン情報	備考
DG療法(ドセタセル + ゲムシタール) Day1	子宮平滑筋肉腫	軽度	子宮平滑筋肉腫	ゲムシタール:90mg/m ² Day1 3週毎
DG療法(ドセタセル + ゲムシタール) Day8	子宮平滑筋肉腫	軽度	子宮平滑筋肉腫	ゲムシタール:90mg/m ² ドセタセル:70mg/m ² Day8 3週毎
TC 療法(パクリタセル + 加林アプラチン)(3週毎) (子宮頸癌)	子宮頸癌	高度	子宮頸癌	パクリタセル:175mg/m ² 加林アプラチン:AUC5 3週毎
TC 療法(パクリタセル + 加林アプラチン)(3週毎) (子宮体癌)	子宮体癌	高度	子宮体癌	パクリタセル:180mg/m ² 加林アプラチン:AUC6 3週毎
ヘパシタマブ + オパブリブ 併用療法 (3週毎)	卵巣癌	最小度	卵巣癌	ヘパシタマブ : 15mg/kg 3週間毎 オパブリブ : 300mg*2回/日
ヘムアミタマブ + レンバチニブ 療法 (子宮体癌) (3週毎)	子宮体癌	最小度	切除不能な進行・再発の子宮体癌	ヘムアミタマブ : 200mg/body Day1/3w レンバチニブ (内服) : 20mg/body Day1-21
ゲムシタール単剤 療法 (卵巣癌) (Day1,8/3w)	卵巣癌	中等度	卵巣癌 (再発、プラチナ抵抗性)	ゲムシタール : 1000mg/m ² Day1,8 3週毎
TC (パクリタセル + 加林アプラチン) + ヘパシタマブ 療法 (子宮体癌) (3週毎)	子宮頸癌	高度	再発子宮頸癌	パクリタセル : 175mg/m ² 加林アプラチン : AUC5 3週毎 ヘパシタマブ : 15mg/kg
Weekly TC 療法(パクリタセル+加林アプラチン)	卵巣癌	高度	卵巣癌	パクリタセル : 60mg/m ² 加林アプラチン : AUC2 1週毎
ヘムアミタマブ + ヘパシタマブ 療法 (子宮頸癌) (3週毎)	子宮頸癌	最小度	再発/進行 子宮頸癌	ヘムアミタマブ : 200mg/body Day1 ヘパシタマブ : 15mg/kg Day1 3週毎
ヘムアミタマブ + レンバチニブ 療法 (子宮体癌) (6週毎)	子宮体癌	最小度	切除不能な進行・再発の子宮体癌	ヘムアミタマブ : 400mg/body Day1 6週毎 レンバチニブ (内服) : 20mg/body Day1-42
ヘムアミタマブ 維持療法 (子宮頸癌) (3週毎)	子宮頸癌	最小度	再発/進行 子宮頸癌	ヘムアミタマブ : 200mg/body Day1 3週毎 (ヘムアミタマブ + TCまたはTP後)
ヘムアミタマブ 維持療法 (子宮頸癌) (6週毎)	子宮頸癌	最小度	再発/進行 子宮頸癌	ヘムアミタマブ : 400mg/body Day1 6週毎 (ヘムアミタマブ + TCまたはTP後)
ヒゾリマブ 療法 (子宮頸癌) (3週後毎)	子宮頸癌	最小度	子宮頸癌	ヒゾリマブ : 200mg/body 3週毎
GEM-C-Bev療法 (3週毎)	卵巣癌	高度	再発卵巣癌	加林アプラチン: AUC4 Day1 ゲムシタール: 1000mg/m ² Day1,8 ヘパシタマブ:15mg/kg Day1 3週毎
ヘムアミタマブ + シスプラチン 療法 (3週毎)	子宮頸癌	高度	子宮頸癌	ヘムアミタマブ : 200mg/body Day1 シスプラチン : 40mg/m ² Day1,8,15 3週毎
ヘムアミタマブ 単剤維持療法導入期 (子宮頸癌) (3週毎)	子宮頸癌	最小度	子宮頸癌	ヘムアミタマブ : 200mg/body Day1 3週毎
ヘムアミタマブ 単剤維持療法 (子宮頸癌) (6週毎)	子宮頸癌	最小度	子宮頸癌	ヘムアミタマブ : 400mg/body Day1 6週毎
cTC (パクリタセル + 加林アプラチン) + テムシバレルマブ 療法 (子宮体癌) (3週毎)	子宮体癌	高度	子宮体癌	加林アプラチン: AUC6 Day1 パクリタセル:175mg/m ² Day1 テムシバレルマブ:1120mg/body Day1 3週毎
テムシバレルマブ + オパブリブ 維持療法 (子宮体癌) (30kg超) (4週毎)	子宮体癌	最小度	子宮体癌 (pMMRに限る)	テムシバレルマブ:1500mg/body Day1 オパブリブ:600mg/day 連日 4週毎
テムシバレルマブ + オパブリブ 維持療法 (子宮体癌) (30kg以下) (4週毎)	子宮体癌	最小度	子宮体癌 (pMMRに限る)	テムシバレルマブ:20mg/kg Day1 オパブリブ:600mg/day 連日 4週毎
テムシバレルマブ 維持療法 (子宮体癌) (30kg超) (4週毎)	子宮体癌	最小度	子宮体癌	テムシバレルマブ:1500mg/body Day1 4週毎
テムシバレルマブ 維持療法 (子宮体癌) (30kg未満) (4週毎)	子宮体癌	最小度	子宮体癌	テムシバレルマブ:20mg/kg Day1 4週毎
cTC (パクリタセル + 加林アプラチン) + ヘムアミタマブ 療法 (子宮体癌) (3週毎)	子宮体癌	高度	子宮体癌	加林アプラチン: AUC5 Day1 パクリタセル:175mg/m ² Day1 ヘムアミタマブ:200mg/body Day1 3週毎

女性生殖器がん(更新：2025年1月)

レジメン名称	癌種	催吐リスク	レジメン情報	備考
ℳℳℳℳℳℳℳ 維持療法（子宮体癌）（6週毎）	子宮体癌	最小度	子宮体癌	ℳℳℳℳℳℳℳ：400mg/body 6週毎