

腎・泌尿器がん(更新：2023年6月)

レジメン名称	癌種	催吐リスク	レジメン情報	備考
ニホ®ルマフ®療法(腎細胞癌)(2週毎)	腎細胞癌	最小度	腎細胞癌	ニホ®ルマフ®:240mg/body 2週毎
カバ®シ®タキル®療法(3週毎)	前立腺癌	軽度	前立腺癌	カバ®シ®タキル®:25mg/㎡ 3週毎 プレドニゾロン 連日
トセタキル®(単剤)療法(3週毎)	前立腺癌	軽度	前立腺癌	トセタキル®:70mg/㎡
ハ®ム®ロリス®マフ®療法(尿路上皮癌)(3週毎)	尿路上皮癌	最小度	尿路上皮癌	ハ®ム®ロリス®マフ®:200mg/body 3週毎
ハ®ム®ロリス®マフ®療法(尿路上皮癌)(6週毎)	尿路上皮癌	最小度	尿路上皮癌	ハ®ム®ロリス®マフ®:400mg/body 6週毎
GCショートハイト®レション®療法(Day8,15/4w)	尿路上皮癌	軽度	尿路上皮癌	ケムシタ®ン:1000mg/㎡ Day8,15 1クル:28日
GCショートハイト®レション®療法(Day1/4w)	尿路上皮癌	高度	尿路上皮癌	ケムシタ®ン:1000mg/㎡ シス®ラチン:70mg/㎡ Day1 1クル:28日
ル®クリタキル®+ケムシタ®ン®療法(Day1/3w)	尿路上皮癌	軽度	尿路上皮癌	ル®クリタキル®:200mg/㎡ Day1 ケムシタ®ン:1000mg/㎡ Day1,8,15 1クル:21日
アハ®ルマフ®+アキチニフ®療法(腎細胞癌)(2週毎)	腎細胞癌	軽度	腎細胞癌	アハ®ルマフ®:10mg/kg Day1 アキチニフ®:10mg/day 1クル:14日
ハ®ム®ロリス®マフ®+アキチニフ®療法(腎細胞癌)(3週毎)	腎細胞癌	軽度	腎細胞癌	ハ®ム®ロリス®マフ®:200mg/body Day1 アキチニフ®:10mg/day 3週毎
ハ®ム®ロリス®マフ®+アキチニフ®療法(腎細胞癌)(6週毎)	腎細胞癌	軽度	腎細胞癌	ハ®ム®ロリス®マフ®:400mg/body Day1 アキチニフ®:10mg/day 6週毎
MVAC®療法(Day15,22/4w)	尿路上皮癌	軽度	尿路上皮癌	メトリネート:30mg/㎡ 1クル-Ⅱ:3mg/㎡ Day15,22 (Day1,8は入院にて実施)
アハ®ルマフ®維持療法	尿路上皮癌	最小度	尿路上皮癌	アハ®ルマフ®:10mg/kg 2週毎
ワ®ジ®-ホ®+カ®ザンチニフ®療法(2週毎)	腎細胞癌	最小度	腎細胞癌	ニホ®ルマフ®:240mg/body 2週毎 カ®ザンチニフ®:40mg 連日内服
ワ®ジ®-ホ®+カ®ザンチニフ®療法(4週毎)	腎細胞癌	最小度	腎細胞癌	ニホ®ルマフ®:480mg/body 4週毎 カ®ザンチニフ®:40mg 連日内服
インヒビタマフ®ハ®ト®チン®療法	尿路上皮癌	最小度	根治不能な尿路上皮癌	インヒビタマフ®ハ®ト®チン®:1.25mg/kg Day1,8,15 4週毎
ニホ®ルマフ®療法(尿路上皮癌術後補助療法)(2週毎)	尿路上皮癌	最小度	尿路上皮癌 術補助療法	ニホ®ルマフ®:240mg/body 2週毎
ニホ®ルマフ®療法(尿路上皮癌術後補助療法)(4週毎)	尿路上皮癌	最小度	尿路上皮癌 術補助療法	ニホ®ルマフ®:480mg/body 4週毎
ハ®ム®ロリス®マフ®+レンハ®チニフ®療法(腎細胞癌)(3週毎)	腎細胞癌	最小度	根治切除不能又は転移性の腎細胞癌	ハ®ム®ロリス®マフ®:240mg/body 3週毎 レンハ®チニフ®:20mg/body 連日内服
ハ®ム®ロリス®マフ®+レンハ®チニフ®療法(腎細胞癌)(6週毎)	腎細胞癌	最小度	根治切除不能又は転移性の腎細胞癌	ハ®ム®ロリス®マフ®:480mg/body 6週毎 レンハ®チニフ®:20mg/body 連日内服
ケムシタ®ン®+カ®ホ®ブ®ラチン®療法(3週毎)	尿路上皮癌	高度	尿路上皮癌	カ®ホ®ブ®ラチン®:AUC5 Day1 ケムシタ®ン®:1000mg/㎡ Day1,8 3週毎
ケムシタ®ン®+カ®ホ®ブ®ラチン®療法(4週毎)	尿路上皮癌	高度	尿路上皮癌	カ®ホ®ブ®ラチン®:AUC5 Day1 ケムシタ®ン®:1000mg/㎡ Day1,8,15 4週毎
ハ®ム®ロリス®マフ®療法(3週毎)	腎細胞癌	最小度	腎細胞癌 術後補助療法	ハ®ム®ロリス®マフ®:200mg/body 3週毎
ハ®ム®ロリス®マフ®療法(6週毎)	腎細胞癌	最小度	腎細胞癌 術後補助療法	ハ®ム®ロリス®マフ®:400mg/body 6週毎
トセタキル®+タ®ルミト®+ADT®療法(3週毎)	前立腺癌	軽度	ホルモン感受性転移性前立腺癌	トセタキル®:75mg/㎡ Day1 3週毎 タ®ルミト®:1200mg/day 連日 アンドロゲン除去療法(ADT)併用
BEP®療法(3週毎)	精巣癌	高度	精巣癌	ブレオマイシン:30mg/body Day1,8,15 イト®シト®:100mg/㎡ Day1-5 シス®ラチン:20mg/㎡ Day1-5 3週毎