

皮膚がん(更新：2024年6月)

レジメン名称	癌種	催吐リスク	レジメン情報	備考
コホ®療法(悪性黒色腫)(2週毎)	悪性黒色腫	最小度	悪性黒色腫	術後補助化学療法:12ヶ月間まで コホ®:240mg/body 2週毎
化®療法(3週毎)	悪性黒色腫	最小度	根治切除不能な悪性黒色腫	化®:3mg/kg 3週毎 4回投与
ヘ®療法(悪性黒色腫)(3週毎)	悪性黒色腫	最小度	悪性黒色腫	術後補助化学療法:12ヶ月間まで ヘ®:200mg/body
ア®療法(2週毎)	メラノ細胞癌	最小度	メラノ細胞癌	ア®:10mg/kg 2週間毎
コホ®+化®併用療法(悪性黒色腫)(3週毎)	悪性黒色腫	最小度	根治切除不能で未治療の悪性黒色腫	コホ®:80mg/body 化®:3mg/kg 3週毎
ト®療法(3週毎)	軟部肉腫	軽度	皮膚血管肉腫、乳房外paget病	ト®:60mg/m ² triweekly
weekly ト®療法	軟部肉腫	軽度	皮膚血管肉腫、乳房外paget病	ト®:30mg/m ² weekly
Weekly ル®療法(2回目以降)(6投2休)	軟部肉腫	軽度	血管肉腫	ル®:100mg/m ² 6週投与 2週休薬
ヘ®療法 (3週間毎)	悪性黒色腫	最小度	悪性黒色腫	ヘ®: 200mg/body 3週毎
ヘ®療法 (6週間毎)	悪性黒色腫	最小度	悪性黒色腫	ヘ®: 400mg/body 6週毎
コホ®療法(上皮系皮膚悪性腫瘍)(2週毎)	上皮系皮膚悪性腫瘍	最小度	上皮系皮膚悪性腫瘍	コホ®:240mg/body 2週毎
コホ®療法(上皮系皮膚悪性腫瘍)(4週毎)	上皮系皮膚悪性腫瘍	最小度	上皮系皮膚悪性腫瘍	コホ®:480mg/body 4週毎