

脳腫瘍(更新：2020年7月)

レジメン名称	癌種	催吐リスク	レジメン情報	備考
Λ ^o Λ ^o シス ^o マ ^o 単独維持療法(Day1,22/6w)(15mg/kg)	悪性神経膠腫	最小度	悪性神経膠腫	Λ ^o Λ ^o シス ^o マ ^o :15mg/kg Day1,22
ニムス ^o 単独維持療法	悪性神経膠腫	軽度	悪性神経膠腫	ニムス ^o :80mg/m ² 6週毎
Λ ^o Λ ^o シス ^o マ ^o 維持療法(テリ ^o ニト ^o 併用)(Day1,22/6w)	悪性神経膠腫	中等度	初発悪性神経膠腫	Λ ^o Λ ^o シス ^o マ ^o :10mg/kg Day1,15 テリ ^o ニト ^o 錠:Day1-5 サイ ^o ル1:150mg/m ² /day サイ ^o ル2:150-200mg/m ² /day 1 ケ ^o ル:42日
Λ ^o Λ ^o シス ^o マ ^o 単独維持療法(Day1,15/4w)(10mg/kg)	悪性神経膠腫	最小度	悪性神経膠腫	Λ ^o Λ ^o シス ^o マ ^o :10mg/kg Day1,15 1ケ ^o ル:28日
PAV 療法	悪性神経膠腫	高度	乏突起膠腫	ニムス ^o :80mg/m ² Day1 ビ ^o ンカス ^o マ ^o :1.2mg/m ² Day8,29 プ ^o ニカ ^o ル ^o シ ^o マ ^o 60mg/m ² Day8-21 1ケ ^o ル:42日