

頭頸部がん(更新：2026年3月)

レジメン名称	癌種	催吐リスク	レジメン情報	備考
加林ブリン療法(AUC1.5)	頭頸部癌	中等度	頭頸部癌	加林ブリン:AUC1.5 weekly
S-1 + 加林ブリン療法(AUC1.5)	頭頸部癌	中等度	頭頸部癌	S-1:80mg 加林ブリン:AUC1.5 weekly
ニボルマブ療法(頭頸部癌)(2週毎)	頭頸部癌	最小度	再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌	ニボルマブ:240mg/body 2週毎
ドセタキセル療法(2週毎)	頭頸部癌	軽度	頭頸部癌	ドセタキセル:40mg/m ² 1ケル:2週間
ドセタキセル療法(30mg)	頭頸部癌	軽度	頭頸部癌	ドセタキセル:30mg 1週毎
PCE療法(ドセタキセル + 加林ブリン + セキナズマブ)(初回 Day1/3w)	頭頸部癌	中等度	頭頸部癌	加林ブリン:AUC2 Day1 ドセタキセル:100mg/m ² Day1,8,15 セキナズマブ:400mg/m ² 初回 250mg/m ² 2回目以降
PCE療法(ドセタキセル + 加林ブリン + セキナズマブ)(Day1,8/3w)(2回目以降)	頭頸部癌	中等度	頭頸部癌	加林ブリン:AUC2 Day1,8 ドセタキセル:100mg/m ² Day1,8 セキナズマブ:250mg/m ² Day1,8
PCE療法(ドセタキセル + 加林ブリン + セキナズマブ)(Day15/3w)(セキナズマブのみ)	頭頸部癌	最小度	頭頸部癌	セキナズマブ:250mg/m ² Day15/3w
セキナズマブ(放射線併用)療法(2回目以降)	頭頸部癌	最小度	頭頸部癌	2回目以降 セキナズマブ:250mg/m ²
セキナズマブ(放射線併用)療法(初回)	頭頸部癌	最小度	頭頸部癌	初回:セキナズマブ:400mg/m ²
セキナズマブ + ドセタキセル療法(2回目以降)(セキナズマブのみ)	頭頸部癌	最小度	再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌	2回目以降 セキナズマブ:250mg/m ²
セキナズマブ + ドセタキセル療法(2回目以降)(Weekly)	頭頸部癌	軽度	再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌	2回目以降 セキナズマブ:250mg/m ² ドセタキセル:80mg/m ²
セキナズマブ + ドセタキセル療法(初回)	頭頸部癌	軽度	再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌	初回 セキナズマブ:400mg/m ² ドセタキセル:80mg/m ²
ドセタキセル療法(初回)(80mg/m ²)	頭頸部癌	軽度	再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌	ドセタキセル:80mg/m ² Day1,8,15/4w(3週投与2週休み)
ドセタキセル療法(2回目以降)(Day1,8,15/5w)(80mg/m ²)	頭頸部癌	軽度	再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌	ドセタキセル:80mg/m ² Day1,8,15/5w(3週投与2週休み)
ペムメット療法(頭頸部癌)(3週毎)	頭頸部癌	最小度	再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌	ペムメット:200mg/body 3週毎
ペムメット療法(頭頸部癌)(6週毎)	頭頸部癌	最小度	再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌	ペムメット:400mg/body 6週毎
セキナズマブ + ドセタキセル療法 (Biweekly)	頭頸部癌	軽度	再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌	セキナズマブ : 500mg/m ² ドセタキセル : 80mg/m ² 1週毎
ケムシタキセル+シスプラチン 導入療法 (上咽頭癌) (3週毎)	上咽頭癌	高度	局所進行上咽頭癌	シスプラチン : 80mg/m ² Day1 ケムシタキセル : 1000mg/m ² Day1,8 3週毎
ケムシタキセル+シスプラチン 導入療法 (再発転移) (3週毎)	上咽頭癌	高度	再発または転移を有する上咽頭癌	シスプラチン : 80mg/m ² Day1 ケムシタキセル : 1000mg/m ² Day1,8 3週毎
ペムメット療法 (術前・術後) (3週毎)	頭頸部癌	最小度	局所進行頭頸部癌	ペムメット : 200mg/body 3週毎
ペムメット療法 (術前・術後) (6週毎)	頭頸部癌	最小度	局所進行頭頸部癌	ペムメット : 400mg/body 6週毎
ペムメット療法 + シスプラチン療法 (術後補助) (3週毎)	頭頸部癌	高度	局所進行頭頸部癌	ペムメット : 200mg/body シスプラチン : 100mg/m ² 3週毎